


Name:

Hautschutzplan

Hautgefährdung durch:	 Hautschutz	 Hautreinigung	 Hautpflege	 Händedesinfektion	 Handschuhe
	<ul style="list-style-type: none"> • vor Arbeitsbeginn • nach Pausen • zwischendurch 	<ul style="list-style-type: none"> • vor Pausen • nach der Arbeit • nach sichtbarer Verschmutzung 	<ul style="list-style-type: none"> • nach Arbeitsende • nach Hautreinigung • bei Bedarf, bzw. morgens und abends 	<ul style="list-style-type: none"> • vor und nach Patientenkontakt • nach Kontakt mit kontaminiertem Material 	<p>Unsterile Einmalhandschuhe z.B. bei</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blutentnahmen • vor Kontakt mit infektiösem Material <p>Sterile Einmalhandschuhe z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> • bei Verbandwechsel <p>Haushandshandschuhe z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> • beim Umgang mit Lösungen • bei Reinigungsarbeiten
Wassermischbare Arbeitsstoffe, z.B.	Prodene Pro 2 ggf. Handschuhe	Prodene Lunea	Prodene Promains		
Nichtwassermischbare Arbeitsstoffe, z.B.	Prodene Pro1 ggf. Handschuhe	Prodene Lunea	Prodene Promains		
Feuchtigkeitsstau und Mazeration, z.B.	Prodene Promains	Prodene Lunea	Prodene Promains		
Nichtphysiologische Besiedlung der Haut, z.B.				Prodene Septigel	
<ul style="list-style-type: none"> • Bakterien • Pilze • Viren 					

Grundlagen sind: Gefahrstoffverordnung und BGR 197 der Berufsgenossenschaften.

Der Einsatz von Schutzhandschuhen gemäß Betriebsanweisung nach §10 GefStoffV und BGR 195 ist zu beachten.

Hautschutz soll ein Eindringen von Schadstoffen in die Haut möglichst gut verhindern und die Hautreinigung erleichtern.

Name:

Desinfektionsplan

Wann?	Wann?	Wie?	Womit?	Wer?
 Hygienische Händedesinfektion	<ul style="list-style-type: none"> • vor Arbeitsbeginn; • vor invasiven Maßnahmen; • zwischen Umgang mit verschiedenen Patienten; • nach Kontakt mit kontaminiertem Material; • nach dem Ablegen von Schutzhandschuhen; • bei Bedarf 	Die Händedesinfektion ist die einfachste, sicherste und billigste Methode zur Verhütung von Kreuzinfektionen. Konzentrat 30 Sek. lang in die trockenen Hände einreiben. Die Hände müssen während der gesamten Einwirkzeit durch das konzentrierte Präparat feucht gehalten werden.	Prodene Septigel 3 ml 30 sek.	Alle Mitarbeiter
 Händewaschung	<ul style="list-style-type: none"> • nach Verschmutzung; • nach Toilettenbesuch; • vor Pausen, • bei Bedarf 	Flüssigseife aus Wandspender auf die befeuchteten Hände geben. Nach dem Waschen Hände gründlich abspülen. Mit Einmal-Handtüchern abtrocknen.	Prodene Lunea	Alle Mitarbeiter
 Haut- und Händepflege	<ul style="list-style-type: none"> • mehrmals täglich; • bei Bedarf 	In die Haut einmassieren.	Prodene Promains	Alle Mitarbeiter
 Hautdesinfektion	<ul style="list-style-type: none"> • vor Blutentnahmen; • vor Injektionen; • Akupunktur 	Präparat aufsprühen, mit sterilem Tupfer abreiben, nochmals aufsprühen, Einwirkzeit einhalten (Haut trocknen lassen).	Einwirkzeit: <i>talgdrüsenarme Haut:</i> 1 Minute <i>talgdrüsenreiche Haut:</i> 10 Minuten	Personal Pflegedienst/ Arzt

Name:

Wann?	Wann?	Wie?	Womit?	Wer?
 <p>Instrumente</p>	<p>sofort nach Gebrauch</p>	<p>Desinfizierend abwischen</p>	<p>Prodene D51</p>	<p>Personal Pflegedienst</p>
 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Blutdruckapparate ▪ Stethoskop ▪ Blutzuckermessg. ▪ Thermometer 	<ul style="list-style-type: none"> • zwingend nach jedem Gebrauch 	<p>Desinfizierend abwischen.</p>	<p>Prodene D51 5 min.</p>	<p>Personal Pflegedienst</p>
<p>Fahrzeuginnenraum (Armaturen, Ablagen etc.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1*wöchentlich • nach Kontamination sofort 	<p>Desinfizierend abwischen.</p>	<p>Prodene Aseptil 5 min.</p>	<p>Personal Pflegedienst</p>
 <p>Mobiliar und Mobiles Inventar</p>  <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rollstühle ▪ Bettgestelle ▪ Überzüge ▪ Nackenrolle 	<ul style="list-style-type: none"> • Bei vorhandenen Infektionen • nach Kontamination sofort 	<p>Desinfizierend abwischen bzw. auswischen.</p>	<p>Prodene Aseptil 5 min. Prodene Nocosomia Spray 5 min.</p>	<p>Personal Pflegedienst</p>
 <ul style="list-style-type: none"> ▪ sonst. kleine Flächen (Türgriffe, Tablets etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x täglich • zwingend nach jedem Gebrauch 	<p>Desinfizierend abwischen. Flächen nicht trocken reiben.</p>	<p>Prodene Nocosomia Spray 5 min.</p>	<p>Personal Pflegedienst</p>
 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Waschbecken ▪ Badewannen ▪ Waschsüsseln  <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nierenschale ▪ Toiletten etc. 	<ul style="list-style-type: none"> • zwingend nach jedem Gebrauch • bei vorhandenen Infektionen 	<ul style="list-style-type: none"> • Desinfizierend abwischen. Kalkablagerungen an den Armaturen mit Essigreiniger entfernen. Perlatoren 1 x monatlich entfernen und in Essigreiniger einlegen. • Brille, Deckel und Armatur – Feucht-Wisch-Methode. Desinfizierende Reinigung des Toilettenbeckens und der Bürstenschale. 	<p>Prodene Nocosomia Spray 5 min.</p>	<p>Personal Pflegedienst/ Reinigungs- personal</p>

Name:

Wann?	Wann?	Wie?	Womit?	Wer?
 ▪ Abfallbehälter	• 1 x täglich	• Abfallbehälter leeren. Desinfizierend abwischen. Neue Abfalltüte einlegen	Prodene Nocosomia Spray 5 min.	Reinigungs- personal
 ▪ Reinigungs- utensilien Aufbereitung	• zwingend nach jedem Gebrauch	• Mops/Lappen nach Gebrauch der Aufbereitung in der Waschmaschine zuführen. Waschprogramm: > 60°C bzw. 95°C.		Reinigungs- personal
 ▪ Fußböden	• 1 x täglich	• Feucht-Wisch-Methode	Prodene Nocosomia surf 0,25 % 15 min.	Reinigungs- personal